



小児のワクチン接種

特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など重症化リスクの高い基礎疾患がある子どもには接種をおすすめしています。詳しくは、市ホームページなどでお知らせします。

- ▶ 接種券発送時期：3月上旬（対象者に個人通知）
 - ▶ 予約開始、接種開始：3月中旬
- ※ファイザー社製ワクチンを3週間の間隔をあけて2回接種（保護者の同意と立ち合いが必要）。

- 📍 医療機関（医師会と調整中）
- 👤 対5歳～11歳 📄 料無料 📄 持母子健康手帳
- 📞 申①インターネット②コールセンター ☎0570-00-0389③市役所・支所窓口



新型コロナワクチンの効果

- Q 新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？
- A 新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

新型コロナワクチンの安全性

- Q 子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？
- A 注射した部分の痛みが一番多く現れます。

数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み、はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

- Q 若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうですか？
- A 米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

ワクチン接種後、4日程度の間子どもに胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して接種を受けたことを伝えてください。心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが多くは安静によって自然回復します。

コロナワクチン追加接種（3回目）

一定の期間が経過した人を対象に実施しています。

日 程	2回目接種からの経過期間	
	65歳以上	18～64歳
2月～	7ヵ月	8ヵ月
3月～	6ヵ月	7ヵ月

※原則、2回目の接種から8ヵ月以上経過した人を対象としていますが、国の方針により一部前倒して実施しています。18～64歳の接種券は、2回目接種完了月の早い人から順に2月中旬から発送しています。



📞 保険健康課ワクチン接種推進班 ☎24-1111内線3131 📠 24-1124