

腹痛



おなかが痛い！

次のうちどちらの症状がみられますか？

- ①うんちに血が混ざっている
- ②陰のう、股のつけねを痛がる
- ③おなかを激しくぶつけた
- ④おなかがパンパンにふくらんでいる
- ⑤コーヒーの残りかすのようなものを吐いた
- ⑥おなかを押すと痛がる

あ
つ
て
は
ま
る

救急医療機関を受診してください



自家用車か
タクシーで行く！

明日の朝など、かかりつけ医を受診してください

時間とともに具合が悪くなったら**救急医療機関**を受診してください

- ①腹痛が2、3日続いている
- ②おなかにくる風邪が周りで流行っている
- ③数日便がでていない
- ④おへその周りを痛がる

1
こ
と
も
あ
ら
ず

明日の朝など、かかりつけ医を受診してください

時間とともに具合が悪くなったら**救急医療機関**を受診してください

ひきつけ・けいれん



けいれんがおきた

- ①けいれんが5分以上続く
- ②けいれんが止まっても、意識がもどらない
- ③くちびるの色が紫色で、呼吸が弱い
- ④最近頭を激しくぶつけた

1
こ
と
も
あ
ら
ず

救急車を呼ぶ



救急医療機関を受診してください

明日の朝など、かかりつけ医を受診してください

時間とともに具合が悪くなったら**救急医療機関**を受診してください

子どものけいれんでは「熱性けいれん」が多くみられます。「熱性けいれん」は、6か月～5歳頃のお子さんが発熱時(しばしば38度以上)にけいれんする病気です。けいれん発作時には、左右の手足が同じように力が入ったり、動いたりしますが、5分程度で自然にとまります。それ以外の年齢で発熱時にけいれんする場合には、救急医療機関への受診が望まれます。

あ
て
は
ま
ら
ない



- ①生まれて初めてのけいれんである
- ②けいれんが起きた時、体温が38℃以下であった
- ③けいれんに左半身、右半身で差がある
- ④繰り返し吐く
- ⑤生後6か月未満(あるいは6歳以上)で発熱時にけいれんする
- ⑥何度も、繰り返してけいれんが起こる

あ
つ
て
は
ま
る



自家用車か
タクシーで行く！

あ
つ
て
は
ま
ら
ない

すでに診断がついており、
今までにも何度か起こった
ことがあるけいれん発作(てんかん)